



31 %

Loperamid akut - 1 A Pharma*
10 Hartkapseln

2,35 €

1,60 €

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid.
Anwendungsgebiete: Wird zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Kinder ab dem 12. Lebensjahr angewendet, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht.




33 %

ASPIRIN PLUS C*
10 Brausetabletten

5,69 €

3,79 €

Anwendungsgebiete: Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen, schmerzhafte Beschwerden, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten; Fieber.



31 %

10,85 €

7,40 €

Cromo-ratiopharm
10 ml Nasenspray
15 ml Augentropfen*
1 Kombipackung

Wirkstoff: Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz.
Anwendungsgebiete: Gegen allergischen Schnupfen, der zusammen mit einer allergisch bedingten Bindehautentzündung auftritt; bei Heuschnupfen, wenn allergische Symptome an Nase (z. B. Fließschnupfen) und Auge (z. B. Juckreiz, Tränen) auftreten.



32 %

Pantoprazol-ratiopharm SK 20 mg*
14 Tabletten

9,70 €

6,50 €

Wirkstoff: Pantoprazol natrium.
Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen Behandlung von Reflux-Symptomen (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) bei Erwachsenen.



31 %

Mastu Salbe
mit Applikator
30 g

7,97 €

5,46 €

(18,20 € / 100 g)



33 %

Voltaren Schmerzgel*
180 g

17,90 €

11,95 €

Wirkstoff: Diclofenac diethylamin.
Anwendungsgebiete: Zur äußerl. Behandlung v. Schmerzen, Entz. u. Schwellungen bei rheum. Erkrankungen d. Weichteile (Sehnen- u. Sehnmuskelscheidenentz., Schleimbeutelentz., Schulter-Arm-Syndrom, Entz. im Muskel- u. Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke u. im Bereich d. Wirbelsäule, Sport- u. Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen). (6,64 € / 100 g)



Die durchgestrichenen Preise sind die Altpreise der Apotheke. Die prozentuale Ersparnis bezieht sich auf den Altpreis der Apotheke. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Aktionspreise gelten vom 01.05.2012 bis zum 31.05.2012.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

